

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



## Grandes Cultures

### Céréales

Les orges sont en floraison et les blés les plus précoces épiant.

#### Situation

Sur blé la septoriose est bloquée sur la 4ème feuille. L'absence de pluviométrie ne permet pas au champignon d'évoluer et les contaminations sont absentes depuis le 3 mai. Le risque indiqué par le modèle PRESEPT reste inchangé (voir graphique). Il ne s'aggraverait qu'avec l'arrivée de pluies.

#### Préconisations

**Sur orge d'hiver**, les traitements sont maintenant terminés.

**Sur blé**, le traitement va dépendre de ce que vous avez appliqué dans votre parcelle :

**1 - Vous êtes dans les secteurs ouest meusien et vallée de Seille :**

Un traitement a dû être appliqué entre les stades 2 noeuds et sortie de la dernière feuille. Si vous avez appliqué une strobilurine ou un OPUS à pleine dose, ce traitement devrait suffire. Si vous avez appliqué une autre triazole ou si vous avez réduit la dose, le traitement sera à renouveler à l'épiaison.

**2 - Vous êtes dans les autres secteurs :**

Si vous avez suivi les Avertissements Agricoles, aucune application n'a encore été faite hormis les traitements spécifiques piétin verse. Un traitement s'impose à l'épiaison (avant, si des pluies surviennent entre temps).

### REGION LORRAINE

Bulletin technique n° 13 du 19 mai 1998

Dans toutes les parcelles où la septoriose est fortement développée sur F4, la pleine dose s'impose quelque soit la triazole utilisée.

Si vous avez fait un traitement depuis plus de 8 à 10 jours, il devra être renouvelé à l'épiaison.

#### Fusariose Epi

La fusariose se développera sur épi si, pendant la floraison, le temps se met à la pluie et dure plusieurs jours. La meilleure protection (qui n'offre qu'une efficacité maximale de 50 à 60 %) est obtenue avec un traitement spécifique pendant la floraison. Les produits les plus efficaces actuellement homologués restent CARAMBA et HORIZON.

#### Colza


Les colzas sont presque entièrement défloris. Quelques symptômes de sclérotinia sont visibles sur les feuilles. Des taches d'alternaria peuvent être visibles sur les feuilles de la base. Aucun traitement fongicide ne se justifie jusqu'à présent.

#### Tournesol

Les premiers pucerons ailés sont visibles dans les parcelles non traitées GAUCHO. Peu de colonies sont formées. Attendre que le seuil d'intervention soit atteint.

**Rappel des seuils d'intervention :**

- 30 à 50 pucerons par plante avant 5 feuilles
- 50 à 100 pucerons par plante de 5 feuilles
- à l'apparition du bouton floral.



**Blé :**  
Traitement à l'épiaison